

Les oiseaux de la Ferme Ornée

L'interdépendance des espèces végétales et animales est évidente dans notre bocage jardiné. Le fait de ne pas "exploiter" - au sens agricole - tous les espaces disponibles, permet le développement de toutes les strates de végétation, de la mousse à la canopée des bosquets en passant par les graminées, les arbustes de sous-bois, les plantes de lisières... l'ensemble offre ainsi toutes les hauteurs d'installation possible pour les nids : pies au sommet des frênes, geais, buses et hiboux moyen-ducs dans les fourches des chênes et des érables, chardonnerets à 2-3 m du sol dans les charmilles, pipit farlouse et bruant jaune au sol. Ces deux dernières espèces profitent de prairies non fauchées (pâturées uniquement en octobre-novembre) pour installer leurs nids sous les touffes d'herbes.

De même, certains bâtiments en pierre n'ont pas de joints cimentés à l'extérieur, ce qui offre une multitude de cavités occupées par des colonies de moineaux, ou plus bas par des troglodytes. Les pignons de granges avec de larges ouvertures accueillent les chouettes effraies et les faucons crécerelles.

Liste complète des oiseaux observés depuis l'été 2000 en toutes saisons

(S= Sédentaire. E = Estivant. H = Hivernant. R = Rare (passage migration, égaré, accidentel...)

Héron cendré. <i>Ardea cinerea</i> . S	Troglodyte mignon. <i>Troglodytes troglodytes</i> . S
Héron pourpré. <i>Ardea purpurea</i> . R	Accenteur mouchet. <i>Prunella modularis</i> . S
Aigrette garzette. <i>Egretta garzetta</i> . R	Rouge-gorge familier. <i>Erithacus rubecula</i> . S
Grande aigrette. <i>Casmerodius albus</i> . H	Rosignol philomèle. <i>Luscinia megarhynchos</i> . E. R
Bernache du Canada. <i>Breuta canadensis</i> . R (issue de captivité)	Rouge-queue noir. <i>Phoenicurus ochruros</i> . S
Oie cendrée. <i>Anser anser</i> . R	Traquet motteux. <i>Oenanthe oenanthe</i> . R
Canard colvert. <i>Anas platyrhynchos</i> . S	Tarier pâtre. <i>Saxicola torquata</i> . S
Canard chipeau. <i>Anas strepera</i> . R	Tarier des prés. <i>Saxicola rubetra</i> . E. R
Sarcelle d'hiver. <i>Anas crecca</i> . H	Grive musicienne. <i>Turdus philomelos</i> . S
Busard St.Martin. <i>Circus cyaneus</i> . R	Grive draine. <i>Turdus viscivorus</i> . R
Buse variable. <i>Buteo buteo</i> . S	Grive litorne. <i>Turdus pilaris</i> . H
Epervier d'Europe. <i>Accipiter nisus</i> . S	Grive mauvis. <i>Turdus iliacus</i> . H
Faucon crécerelle. <i>Falco tinnunculus</i> . S	Merle noir. <i>Turdus merula</i> . S
Faucon émerillon. <i>Falco columbarius</i> . R	Fauvette des jardins. <i>Sylvia borin</i> . E
Perdrix grise. <i>Perdix perdix</i> . S	Fauvette à tête noire. <i>Sylvia atricapilla</i> . S
Faisan de Colchide. <i>Phasianus colchicus</i> . S	Fauvette grisette. <i>Sylvia communis</i> . E
Poule d'eau. <i>Gallinula chloropus</i> . S	Cisticole des joncs. <i>Cisticola juncidis</i> . R
Foulque macroule. <i>Fulica atra</i> . R	Hypolaïs polyglotte. <i>Hippolais polyglotta</i> . E
Vanneau huppé. <i>Vanellus vanellus</i> . H	Pouillot véloce. <i>Phylloscopus collybita</i> . S
Chevalier guignette. <i>Actitis hypoleucos</i> . H	Pouillot fitis. <i>Phylloscopus trochilus</i> . E
Chevalier culblanc. <i>Tringa ochropus</i> . R	Roitelet huppé. <i>Regulus regulus</i> . H
Bécasse des bois. <i>Scolopax rusticola</i> . H	Roitelet triple bandeau. <i>Regulus ignicapillus</i> . R
Bécassine des marais. <i>Gallinago gallinago</i> . H	Gobemouche gris. <i>Muscicapa striata</i> . R
Bécassine sourde. <i>Lymnocyptes minimus</i> . H	Gobemouche noir. <i>Ficedula hypoleuca</i> . R
Mouette rieuse. <i>Larus ridibundus</i> . R	Mésange charbonnière. <i>Parus major</i> . S.
Goéland argenté. <i>Larus argentatus</i> . S	Mésange bleue. <i>Parus caeruleus</i> . S
Pigeon ramier. <i>Columba palumbus</i> . S	Mésange nonnette. <i>Parus palustris</i> . S
Pigeon biset. <i>Columba livia</i> . R	Mésange à longue queue. <i>Aegialos caudatus</i> . S
Tourterelle turque. <i>Streptopelia decaocto</i> . S	Sitelle torchepot. <i>Sitta europaea</i> . R
Tourterelle des bois. <i>Streptopelia turtur</i> . E	Grimpereau des jardins. <i>Certhia brachydactyla</i> . R
Coucou gris. <i>Cuculus canorus</i> . E	Pie bavarde. <i>Pica pica</i> . S
Hibou moyen-duc. <i>Asio otus</i> . S. R	Geai des chênes. <i>Garrulus glandarius</i> . S
Hibou des marais. <i>Asio flammeus</i> . R	Choucas des tours. <i>Corvus monedula</i> . S
Chouette effraie. <i>Tyto alba</i> . S	Corbeau freux. <i>Corvus frugilegus</i> . S
Huppe fasciée. <i>Upupa epops</i> . R	Corneille noire. <i>Corvus corone</i> . S
Chouette chevêche. <i>Athene noctua</i> . R	Etourneau sansonnet. <i>Sturnus vulgaris</i> . S
Martinet noir. <i>Apus apus</i> . E	Moineau domestique. <i>Passer domesticus</i> . S
Martin-pêcheur d'Europe. <i>Aluco alpestris</i> . S. R	Pinson des arbres. <i>Fringilla coelebs</i> . S
Pic vert. <i>Picus viridis</i> . S.	Pinson du nord. <i>Fringilla montifringilla</i> . H. R
Pic épeiche. <i>Dendrocopos major</i> . S	Linotte mélodieuse. <i>Carduelis cannabina</i> . E
Pic épeichette. <i>Dendrocopos minor</i> . R	Chardonneret élégant. <i>Carduelis carduelis</i> . S
Alouette des champs. <i>Alauda arvensis</i> . R	Verdier d'Europe. <i>Carduelis chloris</i> . H
Hirondelle rustique. <i>Hirundo rustica</i> . E	Tarin des aulnes. <i>Carduelis spinus</i> . H
Hirondelle de fenêtre. <i>Delichon urbica</i> . E	Bouvreuil pivoine. <i>Pyrrhula pyrrhula</i> . S
Pipit farlouse. <i>Anthus pratensis</i> . S	Grosbec casse-noyaux. <i>Coccothraustes</i> . R
Pipit des arbres. <i>Anthus trivialis</i> . E. R	Bruant jaune. <i>Emberiza citrinella</i> . S
Bergeronnette grise. <i>Motacilla alba</i> . S	Bruant des roseaux. <i>Emberiza schoeniclus</i> . E
Bergeronnette printanière. <i>Motacilla flava</i> . R	Bruant zizi. <i>Emberiza cirlus</i> . R
Bergeronnette des ruisseaux. <i>Motacilla cinerea</i> . S	Bruant lapon. <i>Calcarius lapponicus</i> . R