



## ALFATIL

Antibiotique

### Dans quel cas le médicament ALFATIL est-il prescrit ?

Cet [antibiotique](#) appartient à la famille des céphalosporines, antibiotiques proches des pénicillines, qui sont actives sur un plus grand nombre de germes que la [pénicilline](#) simple.

Ce médicament est utilisé dans le traitement de diverses maladies infectieuses, notamment des poumons, des bronches, des [sinus](#), de la gorge ou des oreilles, de l'appareil urinaire.

Vous pouvez consulter le(s) article(s) suivants :

- [Les familles d'antibiotiques](#)

### Présentations du médicament ALFATIL

**ALFATIL 125 mg/5 ml** : poudre pour suspension buvable (arôme fraise) ; flacon de 60 ml avec cuillère-mesure de 5 ml et mesurette graduée en mg  
Sur ordonnance (Liste I) -

### Composition du médicament ALFATIL

	p 5 ml	p gél	p 5 ml
Céfaclor	125 mg	250 mg	250 mg
<a href="#">Saccharose</a>	3 g		2,8 g
	p cp LP	p cp LP	
Céfaclor	375 mg	500 mg	

**Substances actives** : [Céfaclor](#), [Céfaclor anhydre](#), [Céfaclor monohydrate](#)

Aucun [excipient](#) commun.

### Contre-indications du médicament ALFATIL

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'[allergie](#) aux céphalosporines.

Votre médecin est seul juge pour prescrire ce médicament en cas d'[allergie](#) aux pénicillines.

### Attention

Des précautions sont nécessaires en cas d'[insuffisance rénale](#).

La survenue de toute [réaction allergique](#) (boutons, œdème, malaise) impose l'arrêt du traitement : consultez rapidement votre médecin. Pensez à toujours signaler vos antécédents d'[allergie](#) à une [céphalosporine](#) ou à une [pénicilline](#).

De nombreux antibiotiques peuvent provoquer des selles liquides ou une [diarrhée](#), généralement bénigne. En revanche, une [diarrhée](#) importante survenant pendant ou dans les jours qui suivent le traitement [antibiotique](#) doit être signalée à votre médecin.

Une diminution de la fièvre ou une disparition des symptômes ne sont pas synonymes de guérison : la durée du traitement doit absolument être respectée pour éviter les rechutes ou l'apparition d'une résistance du [germe](#) à l'[antibiotique](#).

Les suspensions buvables contiennent du [sucre](#) ([saccharose](#)) en quantité notable.

## Fertilité, grossesse et allaitement

### Grossesse :

Aucun effet néfaste pour l'enfant à naître n'a été établi avec ce médicament. Il peut être prescrit pendant la grossesse.

### Allaitement :

Ce médicament passe dans le lait maternel ; la poursuite de l'allaitement est possible, mais tout [symptôme](#) survenant chez le [nourrisson](#) devra être signalé au médecin : [muguet](#), éruption de boutons... pouvant traduire une [intolérance](#) ou une [allergie](#).

## Mode d'emploi et posologie du médicament ALFATIL

Les gélules ne sont pas adaptées à l'enfant de moins de 6 ans. En effet, elles risquent d'obstruer les voies respiratoires si l'enfant déglutit mal et que la gélule passe dans la trachée (fausse route).

Les suspensions buvables et les gélules peuvent être prises à n'importe quel moment de la journée.

Les comprimés à [libération prolongée](#) sont réservés à l'adulte. Il est recommandé de les prendre juste après les repas ou au maximum 1 heure après.

### Posologie usuelle :

- Adulte : elle varie selon les infections entre 500 mg et 1,5 g par jour, en une ou plusieurs prises.
- Enfant et [nourrisson](#) : 20 à 40 mg par kg et par jour, répartis en 3 prises ; soit par exemple pour un enfant de 20 kg : 1 cuillère-mesure de suspension buvable à 125 mg ou 1 pipette remplie jusqu'à la graduation 125 mg, toutes les 8 heures. La dose maximale est de 1 g par jour.

## Conseils

Le médecin prescrit parfois un prélèvement pour identifier le [germe](#) responsable de l'infection et tester sa sensibilité aux antibiotiques. Le résultat de cet examen peut être faussé en cas d'[automédication](#) préalable : ne prenez pas et ne donnez pas d'antibiotiques sans avis médical.

L'éventuelle fatigue n'est pas due à l'[antibiotique](#), mais à l'infection elle-même.

La suspension buvable reconstituée doit être conservée au frais (+ 4 °C) 14 jours au maximum.

## Effets indésirables possibles du médicament ALFATIL

Nausées, [diarrhée](#), vomissements.

Réactions allergiques : [éruption cutanée](#), œdème de [Quincke](#), [choc anaphylactique](#) (exceptionnel)...

Démangeaisons génitales, [candidose](#).

Rarement : anomalie de la [numération formule sanguine](#), élévation des [transaminases](#).

Vous avez ressenti un effet indésirable susceptible d'être dû à ce médicament, vous pouvez nous le déclarer avec le formulaire

[Laboratoire Ethypharm](#)