



## INTRAXONE IM-IV

### (ROCEPHINE)

#### Antibiotique

#### Dans quel cas le médicament INTRAXONE IM-IV est-il prescrit ?

Cet [antibiotique](#) puissant appartient à la famille des céphalosporines, antibiotiques proches des pénicillines, qui sont actives sur un plus grand nombre de germes que la [pénicilline](#) simple. La lidocaïne est un [anesthésique](#) local destiné à combattre la douleur due à l'injection.

Il est utilisé dans le traitement des infections respiratoires ou urinaires graves, notamment chez les personnes fragilisées, et dans le traitement de certaines otites de l'enfant et du [nourrisson](#).

Vous pouvez consulter le(s) article(s) suivants :

- [Gonorrhée \(blennorragie\)](#)
- [Les familles d'antibiotiques](#)

#### Présentations du médicament INTRAXONE IM-IV

##### INTRAXONE IM-IV

**1 g** : préparation injectable ; flacon de poudre et ampoule de solvant de 10 ml  
Sur ordonnance (Liste I)

Les prix mentionnés ne tiennent pas compte des « [honoraires de dispensation](#) » du pharmacien.

#### Composition du médicament ROCÉPHINE IM

	p unité	p unité
Ceftriaxone	500 mg	1 g
dont <a href="#">Sodium</a>	42 mg	83 mg
Lidocaïne chlorhydrate (solvant)	20 mg	35 mg

**Substances actives :** [Ceftriaxone](#), [Ceftriaxone sodique](#)

Excipients : Eau ppi, , [Sodium](#)

#### Contre-indications du médicament INTRAXONE IM-IV

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- [allergie](#) aux céphalosporines,
- [bloc auriculoventriculaire](#) grave,
- [porphyrie](#).

Votre médecin est seul juge pour prescrire ce médicament en cas d'[allergie](#) aux pénicillines.

## Attention

Des précautions sont nécessaires en cas d'[insuffisance rénale](#) grave.

La survenue de toute [réaction allergique](#) (boutons, œdème, malaise) impose l'arrêt du traitement : consultez rapidement votre médecin. Pensez à toujours signaler vos antécédents d'[allergie](#) à une [céphalosporine](#) ou à une [pénicilline](#).

De nombreux antibiotiques peuvent provoquer des selles liquides ou une [diarrhée](#), généralement bénigne. En revanche, une [diarrhée](#) importante survenant pendant ou dans les jours qui suivent le traitement [antibiotique](#) doit être signalée à votre médecin.

Une diminution de la fièvre ou une disparition des symptômes ne sont pas synonymes de guérison : la durée du traitement doit absolument être respectée pour éviter les rechutes ou l'apparition d'une résistance du [germe](#) à l'[antibiotique](#).



Sportif : les anesthésiques locaux ont été retirés de la liste des substances dopantes publiée dans les arrêtés du 20 avril et du 16 août 2004 par le ministère de la Jeunesse et des Sports.

## Interactions du médicament INTRAXONE IM-IV avec d'autres substances

Informez votre médecin si vous prenez un [anticoagulant](#) oral.

## Fertilité, grossesse et allaitement

### Grossesse :

Aucun effet néfaste pour l'enfant à naître n'a été établi avec ce médicament. Il peut être prescrit pendant la grossesse en cas de nécessité.

### Allaitement :

Ce médicament passe dans le lait maternel. L'interruption de l'allaitement devra être envisagée si la durée du traitement dépasse une semaine.

## Mode d'emploi et posologie du médicament INTRAXONE IM-IV

La solution injectable est préparée en mélangeant la poudre et le solvant fourni.

La solution ainsi obtenue est injectée par [voie intramusculaire](#) profonde, jamais par [voie intraveineuse](#).

### Posologie usuelle :

Elle est variable en fonction des indications. À titre indicatif :

- Adulte : 1 à 2 g par jour, en une injection.
- Enfant et [nourrisson](#) : 50 mg par kg et par jour, en une injection.

## Conseils

L'éventuelle fatigue n'est pas due à l'[antibiotique](#), mais à l'infection elle-même.

La solution injectable reconstituée peut avoir une coloration jaune ; celle-ci est normale.

## Effets indésirables possibles du médicament INTRAXONE IM-IV

Douleur au point d'injection.

[Diarrhée](#), nausées, vomissements, [inflammation](#) de la bouche.

Plus rarement :

- maux de tête, vertiges ;
- réactions allergiques : [éruption cutanée](#), [choc anaphylactique](#) (exceptionnel) ;
- anomalie de la [numération formule sanguine](#), augmentation des [transaminases](#).

Exceptionnellement : [pancréatite](#).

Vous avez ressenti un effet indésirable susceptible d'être dû à ce médicament, vous pouvez nous le déclarer

[Laboratoire LDP Torlan](#)