



FEXIDINE 180 mg

(TELFAS^T)

Antiallergique

Dans quel cas le médicament FEXIDINE 180 mg est-il prescrit ?

Ce médicament est un [antihistaminique](#) antiallergique. Contrairement aux antihistaminiques plus anciens, il n'a pas d'effets sédatifs ni atropiniques à la [posologie](#) recommandée.

Il est utilisé dans le traitement de manifestations allergique diverses : [rhinite](#) allergique, [urticaire](#).

Vous pouvez consulter le(s) article(s) suivants :

- [Démangeaisons et prurit](#)
- [Rhinite allergique \(rhume des foins\)](#)

Présentations du médicament FEXIDINE 180 mg

FEXIDINE 180 mg : comprimé ; boîte de 30
Sur ordonnance (Liste II) -

Les prix mentionnés ne tiennent pas compte des « [honoraires de dispensation](#) » du pharmacien.

Composition du médicament FEXIDINE 180 mg

	p cp	p cp
Fexofénadine chlorhydrate	120 mg	180 mg

Substance active : [Fexofénadine chlorhydrate](#)

Excipients : Amidon de maïs modifié, Cellulose microcristalline, Croscarmellose [sel](#) de Na, Fer jaune oxyde, Fer rouge oxyde, Hypromellose, Macrogol 400, Magnésium stéarate, Povidone, Silice colloïdale anhydre, Titane dioxyde

Contre-indications du médicament FEXIDINE 180 mg

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez l'enfant de moins de 12 ans (en l'absence d'étude).

Interactions du médicament FEXIDINE 180 mg avec d'autres substances

Il est préférable de respecter un délai de 2 heures entre la prise de ce médicament et celle des pansements digestifs contenant des sels d'aluminium ou de magnésium.

Informez par ailleurs votre médecin si vous prenez un médicament contenant de l'érythromycine ou du kétoconazole.

Fertilité, grossesse et allaitement

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. Par prudence, son usage est déconseillé chez la femme enceinte ou chez celle qui allaite.

Mode d'emploi et posologie du médicament FEXIDINE 180 mg

Les comprimés doivent être avalés avec un peu d'eau.

Posologie usuelle :

- Adulte et enfant de plus de 12 ans :
- [rhinite](#) : 1 comprimé à 180 mg par jour ;
- [urticaire](#) : 1 comprimé à 180 mg par jour.

Conseils

Ce médicament agit sur les manifestations de l'[allergie](#) mais n'en supprime pas la cause. Si les symptômes persistent ou s'aggravent, n'hésitez pas à consulter votre médecin.

Effets indésirables possibles du médicament FEXIDINE 180 mg

Rarement : [réaction allergique](#).

Exceptionnellement : sécheresse de la bouche, somnolence, maux de tête, sensation de vertiges, nausée.

Vous avez ressenti un effet indésirable susceptible d'être dû à ce médicament, vous pouvez le déclarer.

[Laboratoire Ind-Swift](#)