




Cotoneaster dammeri



| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|----|------|------|-----|------|------|---|---|---|---|---|
| Nom vernaculaire (français) : Cotonéaster de Dammer | | | | | | | | | | | | | |
| Dimension : Hauteur : 20 cm Diamètre : 2 m | | | | | | | | | | | | | |
| Type : arbuste | | | | | | | | | | | | | |
| Sol : | pH : acide / neutre / basique type : sol ordinaire / argileux / sableux humidité : sec / normal / frais / humide autre : | | | | | | | | | | | | |
| Exposition : |    | | | | | | | | | | | | |
| Type de feuillage | Caduc / persistant / marcescent | | | | | | | | | | | | |
| Période de floraison | Hivernale / Printanière / Estivale / Automnale <table border="1" data-bbox="329 1503 980 1602"> <tr> <td>Jan</td> <td>F</td> <td>Mars</td> <td>Av</td> <td>Mai</td> <td>Juin</td> </tr> <tr> <td>Juil</td> <td>A</td> <td>S</td> <td>O</td> <td>N</td> <td>D</td> </tr> </table> | Jan | F | Mars | Av | Mai | Juin | Juil | A | S | O | N | D |
| Jan | F | Mars | Av | Mai | Juin | | | | | | | | |
| Juil | A | S | O | N | D | | | | | | | | |
| Couleur : blanc | | | | | | | | | | | | | |
| ENTRETIEN : | | | | | | | | | | | | | |
| Tailler avant la reprise de la végétation, les bois malades ou morts, ainsi que les branches qui se croisent pour garder un beau port. Après la floraison, tailler légèrement pour supprimer les fleurs fanées et laisser apparaître les fruits. Tailler à nouveau en automne les branches qui cachent les fruits. | | | | | | | | | | | | | |
| INTERET DE LA PLANTE : | | | | | | | | | | | | | |
| Au jardin : en couvre sol ou en haie. | | | | | | | | | | | | | |